

La migration postnuptiale saison 2013/2014

Tendances à l'échelon national

Avertissement - Les "tendances" exprimées ci-dessous le sont à partir des données enregistrées dans les fichiers "lecture d'ailes" et "bilan" de Béc@notes arrêtées au 31 décembre, date retenue non conventionnellement dans les suivis du CNB comme étant celle de la fin de la migration postnuptiale et à laquelle on peut considérer que la majorité des oiseaux ont atteint leur site d'hivernage.

Données brutes -


- ❖ 1753 oiseaux pesés
- ❖ 1828 diagnoses sur 1839 ailes saisies
- ❖ 295 autopsies
- ❖ 67096 heures de chasse saisies pour le calcul de l'ICA

Biométrie-Biologie


Tendances pondérales

- Le poids moyen tous oiseaux confondu est de **308g**, nous ne disposons pas d'éléments comparatifs à la même époque pour les saisons antérieures.

Tendances de l'Âge Ratio



Cette carte met en évidence les difficultés rencontrées pour formuler une tendance fiable de l'âge ratio tant les données sont hétérogènes.




A **71%** il est actuellement "bon" !

Tendances TMS

Nous ne disposons pas, ici non plus, de données antérieures à la même date. La plus grande prudence est donc de mise pour les tendances actuelles qui ne sont pas des meilleures particulièrement pour le "TMS PN".

- "TMS PJ" = 1,63
- "TMS PN" = 1,13

Tendances de la répartition des Adultes




60 % d'adultes en mue suspendue peut sembler être un chiffre élevé !!!


Tendance Sex-ratio

Elle est de **41%** et porte sur **295 autopsies** réalisées majoritairement en Aquitaine. Cette tendance à l'échelon national ne revêt aucune fiabilité.

ICA et pression de chasse



Malgré les disparités induites par une France transversalement "coupée en deux", la tendance semble refléter une présence d'oiseaux plus importante sur la veine Manche/Atlantique !



A l'heure actuelle la pression de chasse est classiquement plus importante en novembre, mois qui présente également un très bon ICA. La tendance affichée par les chiffres de décembre semble montrer qu'une fois encore le "gros" des oiseaux est arrivé assez tardivement (au début du mois) avec pour conséquence de conforter le raccourcissement du temps d'hivernage que l'on constate depuis quelques saisons chez la bécasse comme dans d'autres espèces migratrices.

Pour le CNB l'ICA migratoire de **1,78** arrêté au 31 décembre est le plus élevé enregistré depuis 18 saisons.

Conclusions

Grâce à la facilité de saisie des échantillons que fournissent les membres du CNB, il nous est apparu nécessaire d'établir, pour information, un bilan de la période de migration postnuptiale en fonction des données recueillies à son issue.

La présentation ne peut faire état que de "tendances" qui ne prendront de la valeur que si elles font l'objet d'un suivi établi chaque année avec si possible un échantillonnage identique pour comparaison.

Le bilan 2013/2014 peut et doit servir de référence pour le futur. Il existe plusieurs degrés dans la conception des bilans. Nous avons opté pour la simplicité. Les tableaux que nous avons utilisés seront complétés par les valeurs enregistrées en fin de saison, nous saurons alors et alors seulement la valeur du crédit que nous pouvons accorder aux tendances actuelles et dont les principales confirmations porteront sur :

- ✚ La réalité de la baisse du poids moyen.
- ✚ La hauteur de l'âge ratio avec en particulier la détermination de l'influence des régions dites de l'intérieur.
- ✚ L'importance du nombre d'adultes en mue suspendue, et son incidence sur le "TMS PN".
- ✚ La confirmation de l'importance de l'ICA de décembre et bien entendu de celui de la migration postnuptiale 2013.

Rendez-vous à ROYAN pour le bilan national du CNB de la saison bécassière 2013/2014.

***Remerciements** – Ils vont en premier lieu au père de l'outil permettant saisies et exploitation en temps réel des données Michel BONZOM. Puis à tous ceux, membres, lecteurs d'ailes, délégués et administrateurs qui les premiers ont œuvré pour que la mise en valeur de cette période de migration postnuptiale, pendant laquelle, rappelons-le, s'effectue plus de 70% des prélèvements, devienne par l'instauration de suivis un élément fiable pour la gestion d'une espèce dont nous sommes tous amoureux.*

Gérard AUROUSSEAU

Le 05/01/2014